AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS CINÉTICOS E FORMAÇÃO DE METABÓLITOS DA LINHAGEM DE LEVEDURA ISOLADA, BB2, EM CULTIVOS ANAERÓBICOS COM E SEM ERGOSTEROL/TWEEN 80

¹HONMA, J.M. (janainahonma@gmail.com); ¹SILVA, P.G.P. (pedroppr_gps@hotmail.com); ¹OKA, M.L. (martaligiaoka@gmail.com); ²SILVA, C.A.A. (cinthiaandr@yahoo.com.br); ³FONSECA, G.G. (ggf@ufgd.edu.br).

¹Alunos do curso de Engenharia de Alimentos-UFGD; ²Aluna do Doutorado em Biotecnologia e Biodiversidade-UFGD; ³Professor Doutor do curso de Biotecnologia-UFGD.

Aliado à expansão de setores sucroalcooleiros, há a necessidade de novos microrganismos fermentadores, capazes de transformar substratos em etanol. Objetivou-se com este trabalho avaliar os parâmetros cinéticos e metabólitos, de uma levedura, isolado BB2, em cultivos anaeróbicos realizados com e sem adição de ergosterol/Tween 80 (ET/80), utilizando glicose como fonte de carbono. O isolado BB2 foi obtido do mosto de uma usina de açúcar e álcool do município de Barra do Bugres – MT. Os cultivos foram realizados em placas de Petri contendo meio YEPD (extrato de levedura 1%, peptona 2%, glicose 2% e ágar 2%) estéril, por 48h à 28 °C. O pré-cultivo foi realizado transferindo uma amostra da linhagem para um frasco tipo Erlenmeyer contendo 200 mL de meio mineral estéril e 50 mL de glicose, pH 6,0. Os cultivos foram conduzidos com agitação de 200 rpm, à 30 °C. Retirou-se uma alíquota do pré-cultivo com valor de densidade óptica (DO) ($\lambda = 600$ nm) igual a 1 para os cultivos principais. Em um dos cultivos foi adicionado 10 mg l⁻¹ de ergosterol/420 mg l⁻¹ de Tween 80. A fim de assegurar a condição anaeróbica, houve injeção contínua de gás nitrogênio. As amostras foram recolhidas num intervalo de 30 minutos para determinação de parâmetros cinéticos e metabólitos por meio da cromatografia líquida de alta performance (UPLC). A principal diferença observada entre os cultivos foi o consumo de substrato, pois nos cultivos com adição de ET/80 houve consumo de substrato em 12,5 h de cultivo, enquanto que nos cultivos sem adição o isolado consumiu apenas 20% em 12 horas, perdendo suas atividades fisiológicas posteriormente. Em relação aos parâmetros cinéticos, notou-se que o cultivo adicionado ET/80 obteve maiores valores para velocidade específica de consumo de substrato (μ_s) 0,67±0,01 (MCS⁻¹ h⁻¹); produtividade de etanol (P_{ETH}) 0,21±0,02 (g l⁻¹h⁻¹), conversão substrato a célula ($Y_{x/s}$) 0,12±0,00 (g MCS g⁻¹) e produtividade de biomassa (P_x) 0,08±0,00 (g l⁻¹h⁻¹), quando comparado com o cultivo sem adição ET/80, que obteve para μ_s 0,30±0,03 (MCS⁻¹ h⁻¹), P_{ETH} 0,07±0,01 (g l⁻¹h⁻¹), $Y_{x/s}$ 0,09±0,00 (g MCS g⁻¹) e P_x 0,04±0,01 (g l⁻¹h⁻¹), indicando melhor desenvolvimento do isolado BB2 nos cultivos com ET/80. No que se refere à formação de produtos foi observado produção de etanol ($Y_{ETH/s}$), glicerol ($Y_{Gol/s}$) e ácido acético ($Y_{ac/s}$) em ambos os cultivos, para cultivos com adição de ET/80 verificou taxas de 0,32±0,01 (g ETH g⁻¹), 0,33±0,03 (g GLI g⁻¹) e 0,03±0,00 (g ACE g⁻¹), respectivamente. Enquanto que os cultivos sem adição de ET/80 apresentou taxas de $Y_{ETH/s}$ 0,25±0,05 (g ETH g⁻¹), $Y_{Gol/s}$ 0,18±0,01 (g GLI g⁻¹) e $Y_{ac/s}$ 0,07±0,01 (g ACE g⁻¹). Conclui-se que a adição de ET/80, em anaerobiose, foi necessário para o desenvolvimento do isolado BB2.

Palavra-chave: Leveduras, Cinética, Anaerobiose.

Agradecimentos: CNPq e Laboratório de Bioengenharia – UFGD.