ADIÇÃO DE TIÓIS A IMINAS UTILIZANDO $[Ce(Pro)_2]_2Oxa$ COMO CATALISADOR HETEROGÊNEO

SILVA, Caren Daniele Galeano da¹ (caren_daniele15@hotmail.com); **OLIVEIRA, Aline Rufino de**² (alineoliveira_qi@hotmail.com); **ROCHA, Mariana Pompilio Darbem**³ (mari_pompilio5@hotmail.com); **FERRO, Criscieli Taynara Barce**⁴ (criscielitaynara@hotmail.com); **SILVA, Beatriz Amaral Lopes**⁵ (bia.amaral3@hotmail.com); **DOMINGUES, Nelson Luís de Campos**⁶ (nelsondomingues@ufgd.edu.br)

¹Discente do curso de Licenciatura e Bacharelado em Química – Dourados PIBIC/UFGD;

²Discente do programa de pós-graduação em Química – Maringá/PR; UEM;

³Discente do programa de pós-graduação em Química – Dourados/MS; UFGD;

⁴Discente do curso de Licenciatura e Bacharelado em Química – Dourados/MS; PIBIC/UFGD;

⁵Discente do curso de Licenciatura e Bacharelado em Química – Dourados/MS; PIBIC/UFGD;

⁶Docente do curso de Licenciatura e Bacharelado em Química da UFGD– Dourados.

A formação da ligação C-S é considerada bastante importante e tem atraído diversos pesquisadores devido a essa classe de compostos apresentarem diversas propriedades biológicas, tais como, a síntese da coenzima M e peptídeos. Dentre diversos procedimentos desenvolvidos para construção da ligação C-S, a adição nucleofílica de tióis a iminas têm sido considerada uma eficiente estratégia para a síntese de compostos organossulfurados. Dentre essa classe de compostos, destaca-se os *N*, *S* acetais, devido às suas diversas aplicações farmacológicas, tais como, sedativos, inibidores de células cancerígenas, antibióticos β -lactâmicos, fusaperazina A, entre outros. Entre tantas metodologias para a síntese de *N*, *S* acetais, diversos procedimentos apresentam tempos reacionais bastante elevados, baixos rendimentos, dificuldades de separação do catalisador e reutilização do mesmo. Devido ao potencial biológico dos *N*, *S* acetais, tornou-se necessário o desenvolvimento de uma metodologia que permite a utilização de diversos tióis aromáticos, diferentes iminas e um catalisador que possa ser reutilizado em demais ciclos. Tendo isso em vista, propôs-se neste trabalho a síntese de *N*, *S* acetais utilizando um catalisador heterogêneo $[Ce(Pro)_2]_2Oxa$. Desse modo, foram analisados três parâmetros, sendo eles: influência da quantidade estequiométrica de catalisador, influência do solvente e tempo reacional. Os *N*, *S* acetais foram sintetizados através da adição nucleofílica de tióis a iminas utilizando uma quantidade muito pequena de catalisador 1% mol de $[Ce(Pro)_2]_2Oxa$. Durante a otimização, pode-se observar que em um tempo reacional de 20 minutos, a imina foi completamente consumida. Após identificado o tempo de reação e a quantidade estequiométrica de catalisador, pode-se observar o efeito do solvente na reação, e pode-se observar que a reação possui compatibilidade com solventes de baixa polaridade. Com os parâmetros reacionais já definidos, estendeu-se este trabalho utilizando diversos tióis aromáticos e diversas iminas, e pode-se observar que os melhores resultados surgiram na presença de grupos doadores de elétrons quando estes substituintes estão ligados ao tiól (85-98%) e na presença de grupos retiradores de elétrons quando os mesmos estão ligados a imina (79-98%). As respectivas reações foram monitoradas via cromatografia em camada delgada (CCD), e como método de revelação, utilizou-se luz ultravioleta e cuba de iodo. Os *N*, *S* acetais foram purificados via cromatografia em coluna (CC) utilizando quantidades adequadas de hexano e acetato de etila (9:1). Os produtos obtidos foram caracterizados via Ressonância Magnética Nuclear (RMN), Infravermelho (IR) e Ponto de Fusão (P.F.)

Palavras-chave: *N*, *S* acetais. Catálise. Compostos Organossulfurados.