

### FATORES DE RISCO PARA SÍFILIS EM MULHERES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS - MS

**Kathleen Adrielle Constante (kathleenadrielle12@hotmail.com)**

**Leticya Lima (leticyalima@hotmail.com)**

**Simone Simionatto (simonesimionatto@ufgd.edu.br)**

Sífilis é uma infecção crônica causada pela espiroqueta *Treponema pallidum*. Muitos dos casos de sífilis são assintomáticos ou não diagnosticados, o que leva para o estado latente da doença, perpetuando as infecções. A sífilis no estado latente torna-se ativa por meses ou anos após a infecção inicial, o que facilita o processo de transmissão para indivíduos saudáveis. A mesma é transmitida por meio de contato sexual e durante a gestação. A prevalência da sífilis está relacionada à infecção da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), pois a mesma age como uma porta de entrada na transmissão do vírus HIV, devido à prática sexual de risco. Com isso, as infecções sexualmente transmissíveis (IST) tornaram-se alvos de vigilância epidemiológica. Apesar da sífilis possuir tratamento, continua como um problema de saúde pública importante em países desenvolvidos ou subdesenvolvidos. A doença caracteriza-se por períodos de atividade e latência, pelo acometimento sistêmico disseminado podendo evoluir para complicações graves em pacientes não tratados ou tratados inadequadamente. O objetivo deste estudo foi determinar os fatores de risco associados à infecção causada pelo *T. pallidum* na população feminina, atendida nas Unidades de Estratégia de Saúde da Família de Dourados/MS. Para isso foi realizado uma entrevista com a finalidade de identificar variáveis socioeconômicas e demográficas associadas à sífilis nesta população. Foi um estudo transversal realizado em um período de dezembro de 2015 a agosto de 2016. Os dados obtidos na entrevista foram compilados no programa online Eletronic Data Capture (RedCap) e analisados com o auxílio do programa estatístico SAS. O estudo demonstrou que ter idade <40 anos, não ter parceiro fixo, ter ferida na região genital e possuir histórico de IST são fatores de risco associados à sífilis. Dessa forma observa-se a necessidade do desenvolvimento de ações de educação e promoção de saúde e prevenção das infecções sexualmente transmissíveis para diminuir a transmissão da doença nesta população.

**Palavras-chave:** Sífilis, Fatores de risco, População feminina.