CARACTERÍSTICAS MOLECULARES E PERFIL DE RESISTÊNCIA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTES A METICILINA ISOLADOS EM PACIENTES ATENDIDOS EM UM HOSPITAL PÚBLICO NA CIDADE DE DOURADOS/MS

Murilo De Assis Postauê (murilo.postauê@hotmail.com)

Carolina Rangel De Lima Santos (carolina_nursing@hotmail.com)

Iara Beatriz Andrade Sousa (iarabeatriz.and@gmail.com)

Isabella Da Cruz Franco (isabellacf.isa@gmail.br)

Silvana Marchioro Beutinger (silvanamarchioro@ufgd.edu.br)

O microrganismo gram-positivo *Staphylococcus aureus* pertence a microbiota normal do ser humano, mas possui características oportunistas, causando infecções em pacientes imunologicamente comprometidos e institucionalizados, sendo hoje um dos microrganismos mais relacionados a infecções hospitalares. Este quadro apenas se agravou com o uso irracional de antibióticos dando origem à cepas *Staphylococcus aureus* resistente a meticilina (MRSA), as quais culminam com o aumento da morbimortalidade, prolongamento do tempo de internação, custos elevados e ameaça constante de disseminação. Este trabalho teve como objetivo a caracterização molecular e perfil de resistência de MRSA isolados de pacientes atendidos em um Hospital público da cidade de Dourados/MS. As amostras foram coletadas de agosto de 2016 a agosto de 2017, e foram analisadas por sistemas automatizados do hospital quanto a susceptibilidade a antimicrobianos e identificação preliminar da espécie bacteriana. Apenas as cepas que apresentaram perfil de resistência a oxacilina foram selecionadas para este estudo. Todas as análises posteriores foram efetuadas no Laboratório de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Grande Dourados. As provas fenotípicas de catalase e coagulase foram efetuadas para a confirmação da espécie bacteriana das amostras. Posteriormente as amostras de *Staphylococcus aureus* tiveram seu DNA extraído, para avaliar o perfil genético por meio da Reação em Cadeia de Polimerase (PCR). Na PCR as amostras foram analisadas quanto a presença do gene *mecA* para a confirmação da resistência a meticilina, *femA* para a resistência a beta-lactâmicos, virulência pelo gene *pvl*, *SCCmec I a V* para o tipo de cassete gênico responsável pela resistência a meticilina e *nucA* quanto a confirmação da espécie. O resultado da PCR foi revelado pela análise de eletroforese em gel de agarose. De 30 amostras analisadas, 66% possuem resistência à pelo menos três classes de antimicrobianos e são considerados multirresistentes. Das amostras, 100% apresentaram a presença dos genes *mecA* e *nucA*, sendo MRSA positivos; 60% amplificaram o gene *pvl*, podendo indicar que estes provem da comunidade; 53,3% demonstraram o gene *femA*, forte indicativo de resistência à beta-lactâmicos; e 33%, 0%, 3%, 43,3% e 13,3% apresentaram respectivamente os genes *SCCmec I a V*, sendo que 6,6% não apresentaram à amplificação de nenhum deles, demonstrando um cassete gênico diferente dos cinco estudados. Os resultados deste estudo indicam a circulação de cepas de MRSA com características moleculares distintas e poderá auxiliar no desenvolvimento de estratégias mais eficazes para o controle de infecções hospitalares bem como na conscientização sobre o uso racional de antimicrobianos.