AValiação dos parâmetros cinéticos da levedura *Saccharomyces cerevisiae* SA-1 em cultivo com glicose e diferentes temperaturas

Otávio Gonçalves Benites Marques (otaviobenites_marques@hotmail.com)

Nathanya Nayla (nathanya.nayla@hotmail.com)

Cinthia Aparecida De Andrade Silva (cinthiaandr@yahoo.com.br)

Gustavo Graciano Fonseca (GustavoFonseca@ufgd.edu.br)

As leveduras são organismos eucariontes unicelulares que possuem como características, uma das mais antigas propriedades biotecnológicas da humanidade, a fermentação. Esses microrganismos, são utilizados para produção de bebidas e alimentos provenientes do processo fermentativo, o que os tornam uma espécie de fábrica celular na produção de pães, cervejas, vinhos, biocombustíveis (bioetanol) entre outros. Devido a fatores como rápido consumo de fontes de carbono e uma grande tolerância ao etanol, diversas linhagens de *S. cerevisiae* são utilizadas em processos fermentativos. O objetivo do trabalho foi avaliar os parâmetros cinéticos da levedura *Saccharomyces cerevisiae* SA-1, em condições de aerobiose, utilizando glicose como fonte única de carbono em duas diferentes temperaturas (32°C e 37°C) a fim de se conhecer a fisiologia dessa linhagem. A linhagem foi armazenada em meio YPD (10 g L⁻¹ extrato de levedura, 20 g L⁻¹ peptona e 20 g L⁻¹ glicose; 20 g L⁻¹ ágar) e cultivada em meio mineral com fonte de carbono 10 g L⁻¹. Durante a cinética de crescimento em meio mineral, amostragens foram realizadas a cada 30 min., a fim de se obter uma curva de crescimento para determinação dos parâmetros cinéticos. Os parâmetros estudados foram velocidade específica de crescimento máximo (μ_{max}), tempo de duplicação (TD), concentração máxima de biomassa (X_{max}) e produtividade de biomassa (PX). Comparando os cultivos à 32°C e 37°C foi possível observar que à 37°C a linhagem apresentou maiores valores de μ_{max} e menor tempo de cultivo. Para ambas as temperaturas, *S. cerevisiae* SA-1 apresentou boa adaptação ao substrato, pois nesses cultivos são encontrados os maiores μ_{max} quando comparados a outros substratos, sendo 0,38 h⁻¹ à 32°C e 0,44 h⁻¹ à 37°C. O TD foi outro parâmetro que confirmou uma boa adaptação da levedura em glicose, uma vez que os valores foram de 1,81h e 1,55h para 32°C e 37°C respectivamente, e quanto menor o tempo que a célula leva para se multiplicar, maior a densidade celular do cultivo. O parâmetro X_{max} obteve valores significativos (3,37 g L⁻¹) para concentração máxima de biomassa em glicose à 37°C quando comparado a outros substratos e a temperatura de 32°C. Com relação aos dados da fisiologia da levedura *S. cerevisiae* SA-1, conclui-se que para parâmetros como velocidade específica de crescimento máximo, concentração máxima de biomassa e produtividade, a eficiência do substrato glicose aliado a temperatura de 37°C é evidente, sendo uma alternativa viável para obtenção de biomassa podendo ser utilizada na indústria alimentícia.