PERDAS FERMENTATIVAS NA SILAGEM DE MILHO ADITIVADAS COM ÓLEOS ESSENCIAIS

SOUZA, Beatriz Silva¹ (beasilvasouzazoo@gmail.com); **SANTOS, Iago Alexandre Scherwitz dos** (iago_sulino@hotmail.com); **EBERHART, Danilo**³ (danilo.eberhart@hotmail.com); **SILVA, Mábio Silva José**⁴ (MabioSilva@ufgd.edu.br); **RODRIGUES, Jefferson Gandra**⁵ (jeffersongandra@gmail.com); **ARAÚJO, Rafael Canonenco**⁶ (rafael@grasp.ind.br)

¹ Discente do Curso de Zootecnia da UFGD

² Discente do Curso de Agronomia da UFGD

³ Discente do Curso de Zootecnia da UFGD

⁴ Docente do curso de Zootecnia da UFGD

⁵ Docente do curso de Zootecnia da UFGD

⁶ Empresário Colaborador

O milho constitui a espécie mais cultivada para a produção de silagem. Porém, o valor proteico desta silagem é baixo. Isto implica na necessidade de maximizar a redução das perdas de compostos solúveis decorrente dos processos fermentativos. O uso de aditivos é uma alternativa para controlar e/ou inibir os processos de fermentação indesejáveis no silo. Desta forma, o objetivo desta pesquisa foi avaliar as perdas fermentativas em silagens de milho aditivadas com diferentes concentrações de óleos essenciais (OE's). O experimento foi composto por cinco concentrações do blend de óleos essenciais (carvacrol 75% e cinamaldeído 25%) em silagem de milho, sendo: 0, 200, 400, 600 e 800 mg kg⁻¹ de matéria fresca de forragem, e um tratamento “controle positivo” (inoculante bacteriano), em um delineamento inteiramente casualizado, com cinco repetições cada. O milho foi plantado numa área de 100 m². Após atingir 30% de matéria seca (MS), a massa de forragem foi colhida e triturada (tamanho de partícula igual a 2 cm). As forragens foram aditivadas com os óleos essenciais e inoculante, e após ensiladas em silos de polietileno, equipados para mensuração das perdas fermentativas. Os silos foram pesados vazios, com areia, com tela de separação e após a ensilagem. Após vedados, foram acondicionados em galpão por 60 dias. Decorrido este tempo, os silos e seus componentes (areia, tela e silagem) foram pesados novamente, para determinação das perdas por gases, por efluentes e recuperação da MS. Não foram verificadas diferenças nas perdas por gases ($P > 0,05$) entre os diferentes tratamentos adotados. As silagens apresentaram comportamento quadrático para o efeito dos OE's sobre as perdas por efluentes ($Y = 214,61 - 0,700X + 0,0007X^2$; $r^2 = 0,62$). As maiores perdas por efluentes ($P < 0,05$) foram observadas nas silagens com 400 mg kg⁻¹ de forragem (71,5 g kg⁻¹ de silagem), estimando-se as maiores perdas com a adição de 500 mg kg⁻¹ de forragem. Quanto as perdas totais de MS, verificou-se efeito quadrático para a adição de OE's ($P < 0,0001$), com menores perdas nas silagens aditivadas com 200 mg kg⁻¹ de forragem (97,07 g kg⁻¹ de silagem), estimando-se as menores perdas de MS para as doses de 440 mg kg⁻¹ de forragem ($Y = 244,84 - 0,528X + 0,0006X^2$; $r^2 = 0,44$). As maiores perdas de MS foram encontradas nas silagens sem aditivos e nas silagens com inoculante bacteriano (274,19 e 222,09 g kg⁻¹ de MS, respectivamente). Desta forma, as maiores recuperação de matéria seca ($P < 0,05$) foram observadas nos tratamentos com as menores perdas (200 mg kg⁻¹ de forragem), verificando-se efeito quadrático para esta variável ($Y = 755,15 - 0,528X + 0,0006X^2$; $r^2 = 0,44$). A adição de OE's promovem a redução das perdas fermentativas em silagens de milho. As menores perdas ocorrem com a dosagem de 440 mg kg⁻¹ de forragem de milho.

Palavras-chave: Modulação fermentativa; conservação de forragem e óleo essencial

Agradecimentos: A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) pela oportunidade de desenvolvimento do experimento apresentado e ao grupo NEPAF por todo suporte, apoio e incentivo a pesquisa desenvolvida.