BIOLOGIA COMPARADA DE EULOFÍDEOS EM PUPAS DE THYRINTEINA ARNOBIA (LEPIDOPTERA: GEOMETRIDAE)

Amanda Araujo De Souza (aaraujodesouza70@gmail.com)
Izabella De Lima Palombo (iza.biotec@gmail.com)
Jéssica Terilli Lucchetta (jessicalucchetta@hotmail.com)
Carlos Reinier Garcia Cardoso (cr.garcia.cardoso@gmail.com)
Ramos Luciano Flavio Neves (luciano.ramos@eldoradobrasil.com.br)
Fabricio Fagundes Pereira (fabriciofagundes@ufgd.edu.br)

A lagarta-parda-do-eucalipto, conhecida como *Thyriniteina arnobia* (Stoll, 1782) (Lepidoptera: Geometridae) destaca-se como uma das principais pragas do eucalipto. O fato de *Palmistichus elaeisis* Delvare e LaSalle, 1993, *Trichospilus diatraeae* Cherian & Margabandhu, 1942 e *Tetrastichus howardi* (Olliff, 1893) (Hymenoptera: Eulophidae) parasitarem pupas de *T. arnobia* em condições naturais, nos motivou a selecionar a espécie de parasitoide com maior capacidade biológica (parasitismo, emergência, duração do ciclo de vida, progênie, razão sexual e longevidade de fêmeas e de machos quando criado em pupas do inseto-praga) visando sua posterior utilização em um programa de controle biológico desse lepidóptero desfolhador em plantios comerciais de eucalipto no Mato Grosso do Sul. O experimento foi desenvolvido no Laboratório de Controle Biológico de Insetos (LECOBIOL) da Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais (FCBA) da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). Pupas de *T. arnobia* foram expostas individualmente ao parasitismo por uma fêmea de *T. howardi*, de *P. elaeisis* e de *T. diatraeae*. Após 24 horas em contato com as pupas, as fêmeas parasitoides foram retiradas com o auxílio de um pincel e as pupas foram transferidas para tubos de vidro (15 x 1 cm) e mantidas em sala climatizada a $25\pm 2^{\circ}\text{C}$, 14 h de fotofase e $70\pm 10\%$ umidade relativa até a emergência da progênie dos parasitoides. A porcentagem de parasitismo; a porcentagem de emergência; a duração do ciclo de vida; a progênie total; a razão sexual e a longevidade de adultos fêmeas e machos foram superiores para *T. diatraeae* com 100,00 (%); $57,14\pm 4,93$ (%); $28,67\pm 0,49$ dias; $89,25\pm 9,67$ indivíduos; $0,94\pm 0,01$; $10,00\pm 1,16$ dias e $10,20\pm 1,80$ dias, respectivamente. Todos os parasitoides conseguiram se reproduzir com êxito em pupas de *T. arnobia*, sendo *T. diatraeae*, o inimigo natural que apresentou de maneira geral, as melhores características biológicas.

Agradecimentos: Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela concessão de bolsa de iniciação científica ao primeiro autor; Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD); Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); Reflore MS (Associação Sul Mato-grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas)..