COMPILAÇÃO DE DADOS SOBRE ATIVIDADE INSETICIDA RELATADOS PARA *ARISTOLOCHIA* SPP.

Tanielen Ramos Poloni^{1*}, Giovana Bianchi Bordim¹, Lígia Garcia Germano¹, Bruno do Amaral Crispim¹, Alexeia Barufatti Grisolia¹, Cláudio Rodrigo Nogueira¹

1. UFGD;

* Autor para contato: tanielenp@gmail.com

As plantas do gênero *Aristolochia* são reconhecidas por exibirem toxicidade incomum para insetos. Essa afirmação é corroborada pelo fato que poucos insetos além de lagartas de borboletas da tribo Troidini alimentam-se sobre tais plantas, bem como por vários estudos biológicos. Apesar disso, a ausência de um artigo de revisão específico sobre os temas supracitados tem dificultado o fácil acesso a uma compreensão crítica e apurada acerca do verdadeiro potencial das *Aristolochia* spp. para o controle de insetos. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi compilar os dados de atividades inseticida, larvicida, mosquitocida e antialimentar relatadas na literatura para *Aristolochia* spp. visando à elaboração futura de uma revisão sistemática. As pesquisas foram realizadas nas principais bases de dados – Chemical Abstract, Scopus, ScienceDirect, Web of Science e PubMed. As palavras-chaves seguintes e combinações destas foram utilizadas nas buscas: larvicidal, insecticidal, mosquitocidal, antifeedant, *Aedes aegypti*, *Anticarsia gemmatalis*, *Spodoptera*, *Aristolochia*, *Aristolochiaceae*. Consideraram-se trabalhos conduzidos com extratos (orgânicos e aquosos) e com substâncias isoladas a partir deles. Em geral, os extratos menos polares foram encontrados ser os mais promissores para o desenvolvimento de produtos inseticida ou para o isolamento de substâncias úteis para o controle de insetos. Isso é bastante interessante, haja visto que derivados nitrofenantrênicos, substâncias reconhecidamente tóxicas e com ocorrência, em plantas, restrita à *Aristolochiaceae*, são pouco solúveis nos principais solventes extratores apolares e de baixa polaridade, contornando assim um dos principais obstáculos para o emprego de *Aristolochia* spp. para o controle de insetos. Duas classes de metabólitos secundários – lignoides e diterpenoides – bastante comuns em *Aristolochia* spp. destacaram-se. Esta pesquisa, portanto, evidenciou que *Aristolochia* spp. são fontes

ricas em compostos fisiologicamente ativos para insetos. Além disto, mostrou que elas, mesmo sendo estigmatizadas por suas ações toxicológicas, são adequadas para o desenvolvimento de produtos inseticida.

Palavras-chave: Inseticida, Aristolochiaceae, metabólitos secundários.

Agradecimentos: CNPQ, FUNDECT, CAPES e UFGD.