

PESQUISA/INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PESQUISA/ INICIAÇÃO CIENTÍFICA

**TANINO CONDENSADO DE ACÁCIA-NEGRA COMO ADITIVO PARA BOVINOS: CONSUMO E DIGESTIBILIDADE APARENTE DE NUTRIENTES**

*Evandro Da Silva Oliveira (evandro7256@gmail.com)*

*Luiz Miguel Anschau (lmiguelanschau@gmail.com)*

*Gleice Kélen Rodrigues Da Silva (kelenrodriguesdasilvag@gmail.com)*

*Rafael Henrique De Tonissi E Buschinelli De Goes (rafaelgoes@ufgd.edu.br)*

*Carolina Marques Costa Araujo (carolinaufgd@hotmail.com)*

*Cibeli De Almeida Pedrini (cibeli\_almeida@hotmail.com)*

A busca crescente por produtos naturais, que não deixem resíduos e representem qualquer risco à saúde do consumidor ou ao meio ambiente, abre espaço para o estudo de novos aditivos. Dentre eles, pode-se citar os extratos naturais de plantas que possuem diversos compostos secundários, com potencial para alterar a fermentação ruminal. O presente estudo avaliou os efeitos da inclusão de diferentes doses de tanino da acácia negra (*Acacia mearnsii*) como aditivo natural na suplementação de bovinos em pastejo, em comparação à narasina sobre o consumo e digestibilidade aparente de nutrientes. Foram utilizados cinco novilhos mestiços, canulados no rúmen, com peso médio de  $350 \pm 45$  kg, e idade de  $22 \pm 4$  meses; distribuídos em delineamento quadrado latino 5x5, mantidos em piquetes individuais de *Urochloa brizantha* cv. Marandu e suplementados com concentrado (38%PB) na proporção de 0,3% do peso corporal. Os tratamentos consistiram em quatro níveis de inclusão de tanino (0, 15, 30 e 60 g/dia) e um tratamento com

narasina sódica (13 mg/kg de MS) como controle positivo. Não foram observadas diferenças significativas ( $P>0,05$ ) entre os tratamentos quanto ao consumo de pasto (6,73kg), suplemento (1,29kg), matéria seca (8,03kg), matéria orgânica (7,45kg) e proteína bruta (0,76kg). No entanto, o consumo de fibra em detergente neutro (FDN) aumentou linearmente com a inclusão do tanino nos suplementos ( $P=0,012$ ), variando de 4,39 kg/dia (narasina) a 6,57 kg/dia (60 g/dia de tanino). A digestibilidade aparente da matéria seca e da matéria orgânica não foi afetada pelos tratamentos ( $P>0,05$ ), porém a digestibilidade da proteína bruta foi superior com o uso do tanino ( $P=0,012$ ), alcançando 729,71 g/kg no maior nível de inclusão. A digestibilidade da fibra em detergente neutro (FDN), também teve um crescimento linearmente ( $P=0,024$ ), com valores de 517,52 g/kg para a narasina a 625,81 g/kg para 60 g/dia de tanino. Conclui-se que a inclusão de tanino da acácia negra na dieta de bovinos em pastejo promove efeito positivo sobre o consumo e a digestibilidade da fibra, além de melhorar a digestibilidade da proteína bruta, demonstrando que o uso potencial como aditivo natural alternativo à narasina.

Agradecimentos: CAPES. CNPq; Fundect e Grupo de Estudos em Nutrição e Produção de Ruminantes (NERU) (71/032.380/2022).

Palavras-chave: palavras-chave: acacia mearnsii; suplementação em pasto; tanino; compostos bioativos.