

PESQUISA/INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PESQUISA/ INICIAÇÃO CIENTÍFICA

**EFEITOS PROTETORES CARDIORRENAIS DA FRAÇÃO SOLÚVEL EM
ETANOL DE FRIDERICIA CHICA (BONPL.) L.G. LOHMANN EM RATOS
HIPERTENSOS COM LESÃO RENAL AGUDA**

João Vilella (joaovilella.site@gmail.com)

Cilmara Araújo Sousa (cilmarasousa@hotmail.com)

Aline Aparecida Macedo Marques (alinemarques_nutri@hotmail.com)

Luana Ale (luanaalee@hotmail.com)

Emerson Luiz Botelho Lourenço (emerson@prof.unipar.br)

Arquimedes Gasparotto Junior (arquimedesjunior@ufgd.edu.br)

Doenças cardiovasculares são as principais causas de hospitalizações e mortes em todo o mundo, sendo a hipertensão um dos principais fatores. Devido ao alto risco de morbidade e mortalidade, a hipertensão não é apenas um fator de risco independente para doenças cardíacas, mas também desempenha um papel crítico na progressão da nefropatia. O uso de terapias complementares, como plantas medicinais, tem se tornado cada vez mais uma opção de tratamento. A espécie *Fridericia chica* (Bonpl.) L.G. Lohmann (Bignoniaceae) popularmente conhecida como "crajiru" ou "carajuru", foi uma das espécies estudadas, com uso popular por infusão para o tratamento de doenças cardiovasculares. A composição química dos extratos obtidos de *F. chica* é complexa e inclui flavonoides, taninos e outros compostos bioativos, que têm demonstrado efeitos promissores em diferentes estudos pré-clínicos. O presente estudo teve como objetivo investigar os efeitos cardioprotetores da

fração solúvel em etanol obtida das folhas de *F. chica* (ESFC) em ratos espontaneamente hipertensos (SHR) tratados com isoprenalina. Para isso, folhas da espécie foram coletadas e submetidas à infusão aquosa, seguida de tratamento com etanol para obtenção da fração solúvel. Ratos Wistar e espontaneamente hipertensos foram distribuídos em grupos experimentais (n=8) incluindo, naïve, controle negativo (veículo), metoprolol (10 mg/kg) e ESFC (30, 100 e 300 mg/kg). Todos os grupos receberam glicerol (5 mL/kg), por via intramuscular, uma vez por semana, durante quatro semanas. Ao final dos 28 dias de tratamento, avaliou-se a função renal, o perfil eletrocardiográfico, a pressão arterial, a reatividade do leito vascular mesentérico, bem como marcadores bioquímicos e histopatológicos. O tratamento com ESFC induziu uma resposta natriurética aguda significativa. No sistema cardiovascular, os efeitos também foram relevantes, revertendo alterações eletrocardiográficas e prevenindo a disfunção endotelial induzida pela hipertensão. Além disso, observou-se redução da peroxidação lipídica e aumento da concentração sérica de marcadores indiretos da biodisponibilidade de óxido nítrico. Assim, os dados obtidos indicam que o ESFC induz efeitos cardioprotetores significativos em ratos hipertensos tratados com isoprenalina, possivelmente relacionada à sua ação antioxidante sistêmica. Esta pesquisa contribui para a compreensão das propriedades medicinais de *F. chica*, sugerindo que a espécie apresenta potencial promissor para o desenvolvimento de novos medicamentos fitoterápicos.

Agradecimentos especiais ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e à Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) pela concessão de bolsas de iniciação científica, que viabilizaram o desenvolvimento deste trabalho.

Palavras-chave: doença cardiovascular; fitoterapia; insuficiência renal.