

PESQUISA/INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PESQUISA/ INICIAÇÃO CIENTÍFICA

**POTENCIAL NEUROPROTETOR E ANTI-ALZHEIMER DE TILLANDSIA  
LOLIACEA EM MODELO IN VIVO**

*Débora Fernanda Araújo Costa (defer\_nanda@hotmail.com)*

*João Pedro Brito Cardeliquio (joaopedrocardeliquio2006@gmail.com)*

*Isabella Giunco Estigarribia (isabella.estigarribia010@academico.edu.ufgd.br)*

*Jaqueline Ferreira Campos (jaquelinefcampos@ufgd.edu.br)*

*Kely De Picoli Souza (kelypicoli@ufgd.edu.br)*

*Edson Lucas Dos Santos (edsonsanatos@ufgd.edu.br)*

A espécie *Tillandsia loliacea* (Bromeliaceae) é uma epífita nativa de regiões tropicais da América do Sul, com ocorrência no cerrado brasileiro. Espécies desse gênero possuem propriedades antioxidantes, antimicrobianas e anti-inflamatórias, atribuídas a compostos fenólicos e flavonoides. Considerando o interesse por substâncias neuroprotetoras, capazes de modular o estresse oxidativo e a agregação de peptídeos como o  $\beta$ -amiloide, este estudo investigou o efeito do extrato de *T. loliacea* na toxicidade induzida pelo peptídeo  $\beta$ A1-42, característico da Doença de Alzheimer (DA), utilizando o modelo in vivo *Caenorhabditis elegans* mutante CL2006. O extrato diclorometano:metanol (95:5) foi obtido com o Extrator Acelerado por Solvente Dionex ASE 150. No ensaio de resistência à paralisia, nematoides em estágio L4 foram pré-tratados com o extrato (25, 250 e 500  $\mu$ g/mL) por 1 h a 15 °C e, depois, incubados a 25 °C para indução da paralisia. No ensaio de reversão, indivíduos paralisados foram tratados e avaliados quanto à recuperação motora. Os resultados do

ensaio de resistência mostraram que o grupo controle apresentou  $20,13 \pm 1,20\%$  de indivíduos não paralisados, enquanto os tratados com 25, 250 e 500  $\mu\text{g/mL}$  exibiram  $27,57 \pm 1,56\%$ ,  $30,29 \pm 1,97\%$  e  $32,49 \pm 2,01\%$ , respectivamente. No ensaio de reversão, o controle teve  $42,89 \pm 1,57\%$  de móveis, contra  $49,57 \pm 1,30\%$ ,  $54,37 \pm 1,98\%$  e  $60,68 \pm 1,99\%$  para os grupos tratados. Conclui-se que o extrato de *Tillandsia loliacea* apresentou relevante efeito neuroprotetor, retardando a progressão da paralisia e promovendo a recuperação motora em nematoides expostos a  $\beta\text{A1-42}$ , sugerindo que seus compostos bioativos modulam vias associadas ao estresse oxidativo e à toxicidade do peptídeo  $\beta$ -amiloide. Assim, a espécie surge como uma fonte promissora para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas multifatoriais contra doenças neurodegenerativas.

Agradecimentos à Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) pelo suporte institucional e à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia (FUNDECT) pelo financiamento desta pesquisa, por meio da concessão de bolsa do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC).

Palavras-chave: *c. elegans*; bromélia; peptídeo  $\beta$ -amiloide.